

Instrucciones Postoperatorias

Adenoidectomía

Quejas Normales Después de la cirugía

- La incomodidad de la garganta es mínima. Tylenol o Motrin suele proporcionar suficiente alivio del dolor.
- El dolor de cuello y los dolores de cabeza son comunes, ocurriendo en 5 a 7 días. Este dolor se alivia con la Motrin de los niños o Advil de los niños.
- Fiebre entre 99-100 grados. (Puede empeorar si el niño/niña no toma líquido)
- Puede tener mal aliento por hasta 3 semanas.
- Bastante congestión nasal, por el efecto de hinchazón la nariz.
- A medida que la hinchazón disminuye, mocos y tos son comunes. (Resuelve después de dos semanas)
- Si el paciente se vuelve demasiado hiperactivo pronto puede ocurrir sangrado de la nariz.

Llame a nuestra oficina si nota alguno de los siguientes

Teléfono de oficina # 727-329-5400

Emergencias Quirúrgicas # 727-562-6858

- Fiebre mayor de 102 grados que no responde al Acetaminophen (Tylenol) o Ibuprofen (Advil/Motrin)
- Hemorragias graves en la nariz
- Dolor de cabeza severo o dolor de cuello que no responde a Motrin/Advil en 48-72 horas.
- Náuseas persistentes o vómitos

Instrucciones para el cuidado en la casa

- Comience con una dieta líquida clara y avance a la dieta normal de su hijo.
- Use acetaminophen (Tylenol) y Advil (Motrin) para el dolor y la incomodidad
- El niño/niña debe descansar en casa durante el primer día de postoperatorio
- Aumentar gradualmente la actividad a normal después de 3-4 días, evitando la actividad vigorosa por 3-4 días