

Instrucciones Postoperatorias

Inserción del tubo del oído

Quejas Normales Después de la cirugía

- Drenaje del líquido oído medio durante 2-3 días. Puede ser claro, rojizo o sangriento
- Algunos agitación con fiebre de bajo grado
- Náuseas, vómitos y / o fatiga durante unas horas
- Atemorizados por los sonidos normales, que pueden sonar más fuerte debido a la mejora inmediata en la audición

Llame a nuestra oficina si nota alguno de los siguientes

Teléfono de oficina # 727-329-5400

Emergencias Quirúrgicas # 727-562-6858

- Náuseas persistentes o vómitos
- Drenaje del líquido del oído medio después de 4 días
- Fiebre mayor de 102 grados que no responde al Acetaminophen (Tylenol) o Ibuprofen (Advil/Motrin)

Instrucciones para el cuidado en la casa

- Comenzar con una dieta líquida clara y progresar a la normalidad como su hijo/hija se siente como comer
- Si se le prescriben gotas para los oídos, tenga en cuenta que las gotas pueden causar una sensación ardiente para algunos niños. Si esto persiste llame a la oficina del doctor
- Si su hijo(a) tiene drenaje del oído después de la cirugía y mientras los tubos todavía están en su lugar por favor llame a nuestra oficina
- Programe una cita postoperatoria en 3 semanas para una prueba de audición y examen físico.
- Para proporcionar la continuidad de la atención, una cita de seguimiento será necesaria cada 4-6 meses mientras que los tubos de PE permanecen en el oído