

INSTRUCCIONES DE CUIDADO EN EL HOGAR DESPUÉS DE CIRUGÍA DE CUELLO (INCLUYENDO QUISTE TIROGLOSO, QUISTE BRANQUIÓGENO, GANGLIOS CERVICALES)

Quejas normales postoperatorio

- * Incomodidad mínima en el sitio quirúrgico
- * Puede tener un poco de dolor al tragar. Esto debería resolverse en pocos días
- * Puede tener una ligera secreción de la zona quirúrgica

Llame a la oficina si usted nota cualquiera de lo siguiente

- * Hinchazón excesiva, dolor, la herida roja, o secreción del sitio de la cirugía
- * Dolor que no se alivia con Tylenol o Motrin
- * Dificultad al tragar
- * Náuseas o vómitos persistentes

Instrucciones de cuidado en el hogar

- * Puede regresar a la escuela 48 horas después de la cirugía
- * No puede levantar objetos pesados, hacer deportes o educación física por 3-4 semanas después de la cirugía
- * Mantener la incisión seca y limpia por 1 semana. Puede quitar las gasas en ese momento
- * Después de 1 semana su hijo puede ducharse y limpiar suavemente la área de la incisión con agua tibia y jabón. Las tiras estériles se soltarán, las orillas se levantarán y se caerán
- * Si se usó pegamento quirúrgico, puede ducharse sobre la incisión a cualquier momento
- * Aplicar protector solar en la área de la cirugía que está usada para minimizar las cicatrices